



ISTRUZIONE OPERATIVA GESTIONE PAZIENTI COVID-19: INDICAZIONI PER MSB

1. Oggetto

La presente istruzione operativa riporta le indicazioni relative alla gestione dei pazienti:

- sospetti COVID-19*;
- COVID-19 confermati;

da parte dei MSB operanti nell'ambito di Regione Lombardia.

* Nell'ambito della presente istruzione operativa si definisce quale "sospetto COVID-19" la persona con almeno "uno tra i seguenti segni e sintomi a insorgenza improvvisa: febbre, tosse, difficoltà respiratoria" Rif. Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020.

2. Documenti di riferimento

- Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22 gennaio 2020
- Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020
- Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in Strutture residenziali sociosanitarie – Istituto Superiore di Sanità, 16 marzo 2020
- PRO 12 Deterzione e disinfezione mezzi di soccorso e attrezzature.

3. Responsabilità

La presente istruzione operativa deve essere applicata dalle équipe MSB e dal personale operante in SOREU.

4. Istruzione operativa

Si riportano di seguito le indicazioni per le équipe dei MSB, che devono essere applicate salvo diverse indicazioni della SOREU riferite a casi specifici.

A) Paziente DEAMBULANTE (cod. invio: qualsiasi)

a) DPI da utilizzare

Il Referente per la SOREU indossa i seguenti DPI:

- mascherina chirurgica;
- guanti;
- occhiali di protezione;
- camice monouso idrorepellente.

L'autista e il secondo soccorritore (se presente) indossano i seguenti DPI:

- mascherina chirurgica;
- guanti.

b) Accesso al domicilio e valutazione del paziente

- Al domicilio del paziente accede unicamente il Referente per la SOREU.
- Il Referente per la SOREU:
 - fa indossare al paziente, il prima possibile, una mascherina chirurgica, ogniqualvolta le sue condizioni lo consentano e procede alla valutazione dello stesso;
 - contatta la SOREU al fine di fornire riscontro e di condividere le modalità di trasporto del paziente e la destinazione ospedaliera;
 - comunica ai familiari del paziente le disposizioni della SOREU e che il paziente sarà trasportato senza accompagnatore (poiché in ospedale i familiari non possono accedere);
 - consegna ai familiari il foglio recante i numeri telefonici dell'ATS.

c) Trasporto del paziente

- Dal vano sanitario dell'ambulanza devono essere rimossi lenzuola e coperte. Sul materassino della barella deve essere appoggiato unicamente un lenzuolo monouso nel quale deve essere avvolto il paziente, al fine di ridurre al minimo il contatto con la superficie di appoggio e, in generale, con quanto presente all'interno del vano sanitario.
- Il paziente deve comunque essere assicurato alla barella con le normali modalità.
- Nel vano sanitario dell'ambulanza, insieme al paziente, deve essere presente il Referente per la SOREU (l'eventuale secondo soccorritore, si colloca nel vano guida insieme all'autista).
- A bordo dell'ambulanza non devono essere trasportati ulteriori soggetti (la IOP 16 *Trasporto familiari/accompagnatori dei pazienti* non deve essere applicata).

d) In ospedale

- L'équipe deve attenersi ai percorsi di accettazione del Pronto Soccorso.
- Il Referente per la SOREU consegna il paziente in Pronto Soccorso mentre l'autista e il secondo soccorritore (se presente) rimangono in ambulanza.

B) Paziente NON DEAMBULANTE oppure CODICE DI INVIO ROSSO (anche se deambulante)

a) DPI da utilizzare

Il Referente per la SOREU e il secondo soccorritore (se presente o, in assenza, l'autista) indossano i seguenti DPI:

- mascherina chirurgica;
- guanti;
- occhiali di protezione;
- camice monouso idrorepellente.

In caso di esecuzione di manovre di rianimazione cardiopolmonare, compresa la ventilazione manuale del paziente, deve essere indossata la maschera con facciale filtrante P2 (FFP2).

b) Accesso al domicilio e valutazione del paziente

- All'arrivo in posto, il solo Referente per la SOREU:
 - si avvicina al paziente e fa indossare allo stesso, il prima possibile, la mascherina chirurgica, ogniqualvolta le sue condizioni lo consentano;
 - procede alla valutazione del paziente;
 - in caso di esecuzione di manovre di rianimazione cardiopolmonare, compresa la ventilazione manuale del paziente, i soccorritori devono indossare la maschera con facciale filtrante P2 (FFP2);
 - contatta la SOREU al fine di fornire riscontro e di condividere le modalità di trasporto del paziente e la destinazione ospedaliera;
 - comunica ai familiari del paziente le disposizioni della SOREU e che il paziente sarà trasportato senza accompagnatore (poiché in ospedale i familiari non possono accedere);
 - consegna ai familiari il foglio recante i numeri telefonici dell'ATS.

c) Evacuazione del paziente

L'evacuazione del paziente viene effettuata, di norma, dal Referente per la SOREU e dal secondo soccorritore (entrambi devono indossare i DPI completi: mascherina chirurgica/FFP2, guanti, occhiali protettivi, camice).

In caso di MSB a 2 soccorritori o di necessità di coinvolgimento dell'autista (quale terzo operatore), anche questo ultimo deve indossare i DPI completi che devono essere rimossi prima di accedere al vano guida del mezzo.

Gli operatori che indossano i DPI completi non devono accedere al vano guida dell'ambulanza.

d) Trasporto del paziente

- Dal vano sanitario dell'ambulanza devono essere rimossi lenzuola e coperte. Sul materassino della barella deve essere appoggiato unicamente un lenzuolo monouso nel quale deve essere avvolto il paziente, al fine di ridurre al minimo il contatto con la superficie di appoggio e, in generale, con quanto presente all'interno del vano sanitario.
- Il paziente deve comunque essere assicurato alla barella con le normali modalità.
- Nel vano sanitario dell'ambulanza, insieme al paziente, devono essere presenti il Referente per la SOREU e il secondo soccorritore, se presente (entrambi con i DPI completi).
- A bordo dell'ambulanza non devono essere trasportati ulteriori soggetti (la IOP 16 *Trasporto familiari/accompagnatori dei pazienti* non deve essere applicata).

e) In ospedale

- L'équipe deve attenersi ai percorsi di accettazione del Pronto Soccorso.
- Il Referente per la SOREU e il secondo soccorritore, se presente, consegnano il paziente in Pronto Soccorso mentre l'autista rimane in ambulanza.

C) Indicazioni generali e precisazioni

Disinfezione dell'ambulanza

- Per la detersione e disinfezione dei mezzi e delle attrezzature/apparecchiature in presenza di liquidi organici del paziente (es. sangue, vomito, urine, feci) resta valida la PRO 12 (rev. 3, modalità operativa indicata a pag. 10 e 11), avendo cura di utilizzare ipoclorito di sodio 0,5% (fonte: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità).

In assenza di tale contaminazione, la disinfezione del vano sanitario dell'ambulanza deve essere effettuata con soluzione alcolica al 75/90%, spruzzata e strofinata con panni monouso su tutte le superfici con le quali il paziente è venuto a contatto o con le quali è stato in stretta prossimità (es. materassino della barella, sedia cardiopatica, sedile passeggero, cinture di sicurezza, pareti) e con tutto quanto entrato in contatto con le mani degli operatori.

Inoltre, dopo ogni missione, devono essere sempre disinfettati con soluzione alcolica al 75/90% il volante, la leva del cambio, le cinture di sicurezza e i relativi attacchi, le maniglie e gli attacchi dell'ambulanza nonché tutto quanto entrato in contatto con le mani degli operatori.

La disinfezione del vano sanitario dell'ambulanza deve essere effettuata dal Referente della SOREU, coadiuvato da eventuali altri operatori che indossino i DPI completi (mascherina chirurgica, guanti, occhiali protettivi, camice).

La disinfezione del vano guida deve essere effettuata dall'autista.

Le attività di cui sopra devono essere effettuate al termine della missione, senza rientrare in sede; in caso di non trasporto del paziente devono essere effettuate in strada.

Si raccomanda, pertanto, di predisporre il materiale necessario alla disinfezione a bordo del mezzo.

- I panni monouso utilizzati per la disinfezione, i DPI monouso (guanti, mascherine chirurgiche, camici ...) e i materiali utilizzati per il paziente (lenzuolo monouso ...) devono essere smaltiti come rifiuti potenzialmente infetti (si raccomanda di predisporre, nel vano sanitario dell'ambulanza, un contenitore con sacco monouso richiudibile dedicato a tale scopo, da smaltire appena possibile presso la sede dell'Associazione di soccorso o in Pronto Soccorso).

In ogni caso, la presenza del sacco a bordo del mezzo non preclude l'operatività dello stesso.

Disinfezione degli occhiali protettivi

Gli occhiali di protezione devono essere disinfettati dopo ogni soccorso mediante l'utilizzo di una soluzione alcolica al 75/90%.

Maschera FFP2

Le maschere con filtrante facciale possono essere utilizzate, di norma, sino a un massimo di 4 ore di assistenza effettiva (al netto delle pause tra le missioni).

Lavaggio delle mani

Disinfettare le mani con soluzione alcolica:



- dopo aver consegnato il paziente in Pronto Soccorso;
- dopo aver rimosso i materiali utilizzati per il paziente dall'ambulanza e effettuato la disinfezione della stessa;
- dopo aver rimosso i DPI;
- dopo aver disinfettato gli occhiali protettivi;
- dopo aver smaltito il sacco monouso contenente i rifiuti potenzialmente infetti;
- ogniqualvolta fosse necessario.

Equipaggi a 4 soccorritori

Si dispone che le équipes di soccorso MSB siano composte da 3 oppure da 2 soccorritori (no 4 soccorritori!).

Si raccomanda, in ogni caso, di osservare le regole indicate dal Ministero della Salute (riportate alla pagina seguente).

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



Ministero della Salute



www.salute.gov.it